Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA RPOTECTION DES VEGETAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA DAVERTISSEMENTS

STATION

AGRICOLES

DU LANGUEDOC - ROUSSILLON MONTPELLIER - 16. Rue de la République - Tél. M2 58.72

2ème Année---- 27 Août 1954

INFORMATIONS

SEPTORIOSE OU ROUILLE DU CELERI :

On évitera le développement de cette maladie cryptogamique très grave lorsque l'automne est humide en effectuant périodiquement des pulvérisations avec :

Bouillie bordelaise à 1%

ou Zinèbe cuivre) aux doses indiquées

ou Zinèbe)
ou Ferban . par les

fabricants.

LES PARASITES DES CRUCIFERES : CHOUX, CHOUX FLEURS, NAVETS, etc...

Ces petits insectes attaquent les semis et les plantes jeunes des diverses crucifères.

Faire une application d'un insecticide à base de H.C.H. ou D.D.T. en donnant la préférence aux poudrages-

PIERIDES ET NOCTUELLES :

Les chenilles de plusieurs espèces de papillons peuvent attaquer les diverses crucifères pendant tout leur développement.

Faire, dès les premières attaques, une application avec un insecticide à

base de D.D.T. en donnant la préférence aux poudrages.

La résistance de certaines espèces de chenilles croît avec l'âge, en particulier pour les noctuelles : effectuer les traitements lorsque les chenilles sont encore jeunes.

PUNAISES:

Dès les premiers dégâts, effectuer des traitements avec un insecticide à base d'ester phosphorique ou de lindane ou de roténone.

Cesser les traitements I5 jours au moins avant la récolte dans le cas des traitements effectués avec un ester phosphorique.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles.

P.BERVILLE

L.L.TROUILLON

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon, I6, Rue de la Répu blique-Montpellier.Le Gérant, R BERTRAND. Autor. du 23.I.53. Reproduction, adaptation réservées

Münistère de l'Agriculture

Ecole Nationale d'Agriculture de MONTPELLIER

STATION REGIONALE 4"AVERTISSEMENTS VITICOLES

Montpellier, le 27 Août 1954

EUDEMIS

Note No I2

Le 3ème vol de papillons eudémis se poursuit dans les vignobles mitoyens de l'Hérault et de l'Aude.

Il vient d'être important à Pépieux, un peu moins à la Redorte, Agel, Valros, Montagnac.

Pour ces régions, un traitement à base d'un insecticide homologué s'impose dès le 29 Août.

Le Directeur de la Station Régionale d'Avertissements Viticoles

G.BERNON.

